


NOVAPEX

/ Société



Prochaines activités de la SBM

Claude VILVENS

Lieu de réunion : A partir de 14h, à notre local habituel :

Salle "Memling" (1er étage - ascenseur) - Rue de Genève, 470b – Schaerbeek (Bruxelles)

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

Chris Vos : Faits divers de nos coquillages.

Lors de nos recherches, il arrive à tous d'aborder des sujets quelque peu pointus, faciles ou difficiles, amusants, historiques et parfois même stressants... Chris Vos vous contera l'histoire très particulière d'une enquête sur les turritelles dont l'issue fut surprenante et inattendue... In cauda venenum, voilà un vieil adage qui reste d'une étonnante modernité. Venez-en découvrir la démonstration ...

SAMEDI 9 DECEMBRE 2017

Roland Scaillet & Christiane Delongueville

Favignana, une île paradisiaque dans l'archipel des Egades (Sicile)

Après son quatrième séjour sur l'île de Favignana, à l'ouest de la Sicile, Roland se devait de vous en faire découvrir le charme printanier et de vous présenter la faune d'invertébrés que ramènent les filets des pêcheurs locaux (Cnidaires, échinodermes, ... , et mollusques comme de bien entendu). Une galerie de bien belles choses à découvrir...

*Prévoyez déjà dans vos agendas une réunion **en février et en mars 2018***

Pour les informations de dernière minute (notamment des modifications de l'agenda prévu) :




Sur Internet :

<http://www.societe-belge-de-malacologie.be/>



Novapex/Société : la publication généraliste de la SBM

Rédacteurs en chef : Claude Vilvens & Etienne Meuleman



Tous les articles généraux sont les bienvenus pour Novapex/Société ☺ !

Afin de faciliter le travail de la Rédaction, il est vivement (et le mot est faible ;-)) souhaité de respecter les règles suivantes pour les articles proposés :

- ◆ document MS-Word (pour PC Windows);
- ◆ police de caractères Times New Roman;
- ◆ texte de taille 10, titres de taille 12, auteur(s) de taille 11 (format: XXXX YYYY);
- ◆ interligne simple;
- ◆ toutes les marges à 2,5 cm;
- ◆ document en une seule section;
- ◆ pas de mode colonne;
- ◆ photos en version électronique JPG ou PNG.

ainsi que **les modèles de titres des différentes rubriques**.

Merci pour les Scribes ;-)! N'hésitez pas à demander une page avec en-tête pour cadrer au mieux vos travaux (vilvens.claude@skynet.be ou e.meuleman@skynet.be).

Les rédac'chefs ;-)

Chers lecteurs, chers annonceurs : pour **placer votre publicité dans Novapex/Société**, il suffit de

1) verser le montant correspondant au format souhaité sur le compte

BE61 3630 8317 5217 / BIC: BBRUBEBB de la SBM,
c/o M. Marc Alexandre, Trésorier, rue de la Libération, 45, 6182 Souvret,
selon les tarifs suivants :

prix **sans** la cotisation SBM :

	1/6 page	1/2 page	1 page
1 fois	15 Euros	45 Euros	80 Euros
1 an (4 fois)	60 Euros	130 Euros	250 Euros

prix **avec** la cotisation SBM :

	1/2 page	1 page
1 an (4 fois)	160 Euros	270 Euros

2) faire parvenir aux rédacteurs en chefs (vilvens.claude@skynet.be ou e.meuleman@skynet.be) la publicité à insérer exclusivement au **format jpg**.

La publication débutera avec le numéro de Novapex/Société suivant la date de paiement.

3^{ième} BOURSE INTERNATIONALE DE COQUILLAGES DE PONT A CELLES

21 & 22 Octobre 2017



ECOLE DU CENTRE

Chemin Célestin Freinet, 1

6230 Pont-à-Celles

Belgium

Samedi de 10h00 à 18h00

Dimanche de 10h00 à 15h00

Entrée: 2€

Gratuit pour les - 12 ans

Avec le soutien de



Ville de Pont-à-Celles

Editeur responsable ALEXANDRE Marc rue de La Libération 45 BE-6182 Souvret

© Photo Audrey Bertin



Visite chez Gabriele Sercia, collectionneur à Favignana en Sicile

Roland SCAILLET

Voici sept années déjà que je suis tombé amoureux de l'île de Favignana dans l'archipel des Egades à l'ouest de la Sicile et depuis, je m'y rends tous les deux ans au printemps. J'y ai mes habitudes et j'ai pu y lier connaissance avec ses habitants et en particulier les pêcheurs du port.

Cesare Bogi de Livourne, qu'il ne faut pas présenter aux malacologues accros à la faune méditerranéenne, m'avait recommandé de visiter dans le village un petit musée dirigé par Gabriele Sercia. En 2013, j'ai trouvé porte close et pour cause, Gabriele ne fréquente l'île que durant les mois d'été. Cette année, après l'avoir informé de mon passage sur l'île, il m'a fait l'honneur de déroger à ses habitudes et d'ouvrir son musée durant ce mois de mai. Par ailleurs, il se fait que deux autres sommités de la malacologie italienne de Palerme, prévenues de mon passage à Favignana par Gianni Spada en ont profité pour également faire un saut sur l'île. Entre malacologues, le monde est petit, c'est ainsi que Gabriele Sercia, Ricardo Giannuzzi-Savelli, Francesco Pusateri et moi-même avons fait connaissance dans le musée de Gabriele à la Via Sebastiano Cali Garsia de Favignana.

Gabriele est un autodidacte palermitain passionné depuis son enfance par ce qu'on appelle « les choses de la mer ». Comme pour beaucoup d'entre nous, le virus de la malacologie l'a emporté sur ses autres activités et c'est ainsi que sa collection est née. Plutôt que de la réserver à son propre bonheur, il a décidé d'en faire profiter les autres pour les éveiller à l'appel de la mer. L'archipel des Egades ayant été déclaré réserve naturelle marine depuis la fin des années nonante, c'était là le lieu idéal pour inaugurer en septembre 2010 la **Casa Museo Matteo Sercia**, avec l'appui de la ville de Favignana et les conseils de Francesco Pusateri. L'entrée est libre. Le local est modeste, composé de deux belles pièces garnies de vitrines bien éclairées présentant pour une moitié la faune malacologique marine de Méditerranée et pour l'autre celle des mers tropicales. Ce qui en fait la richesse, ce n'est pas tant la rareté des exemplaires exposés quoique représentatifs et joliment mis en valeur, mais bien la passion avec laquelle Gabriele y assure des visites guidées. Dans une vitrine voisine la malacologie terrestre est quant à elle représentée par des espèces endémiques de Sicile rassemblées par le Dr Ignace Sparacio.

Pendant plusieurs heures, notre petit groupe de passionnés s'est adonné à une activité rare et intéressante, échanges de vues et déterminations des Raphitomidae (Neogastropoda - Conoidea). Mes nouveaux amis de Palerme sont intarissables sur ce sujet et l'étendue de leurs connaissances dans ce domaine est impressionnante. Voilà de quoi booster à mon retour l'envie de revoir en profondeur les déterminations des nombreux spécimens de ce groupe en ma possession.


Mon dernier mot sera consacré à louer l'hospitalité de ces « siciliens » de Palerme. Ciao, Ricardo, Francesco et Gabriele, à un jour prochain, j'espère...




Casa Museo Matteo Sercia - Via Sebastiano Cali Garsia - Favignana - Sicile
Entrée libre - En été, horaires à consulter ou sur rendez-vous



Figure 1. A. Museo, Via Sebastiano Cali Garsia. B. Vitrine des coquilles exotiques. C et E. Visites guidées par Gabriele Sercia. D. Vitrine des coquilles méditerranéennes. E. Ricardo Giannuzzi-Savelli, Francesco Pusateri et Roland Scaillet.



L'écho'quille



Compilation et commentaires de Johann DELCOURT

Gastéropodes	terrestres	Ecologie/biogéographie	Zoochorie/dispersion	News 31
--------------	------------	------------------------	----------------------	---------

Les escargots voyagent par les oiseaux: transport en période de nidification

Les escargots terrestres ne sont pas réputés pour leur rapidité de déplacements, et leur domaine vital varie de quelques décimètres pour les plus petites espèces à quelques centaines de mètres pour les plus grosses. Difficile donc d'imaginer que ces mollusques soient capables de coloniser des zones éloignées où le moindre milieu défavorable (p.ex. un champ, une route, une rivière) constitue une véritable barrière écologique. Cependant, les mollusques terrestres peuvent profiter d'une dispersion passive par les airs, grâce aux oiseaux. En Russie, Shikov & Vinogradov (2013) ont étudié les mouvements d'oiseaux lors de la période de nourrissage au nid de leur portée. Dans le cadre de cette recherche, ils ont observé qu'une fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) transportait aux nids des spécimens de *Fruticicola fruticum* (Bradybaenidae) et *Zonitoides nitidus* (Zonitidae). De même, un merle noir (*Turdus merula*) a été observé apporter à ses poussins une limace *Arion subfuscus* (Arionidae). Cette prédation n'est pas une surprise, mais on ignorait tout des distances de prélèvement. Hors ici, le *Z. nitidus* a été récolté à 48m du nid, et l'*A. subfuscus* a été récolté à au moins 25m, l'oiseau traversant sur le chemin une pinède sèche, milieu défavorable à la limace. Les distances de recherche de proies est essentiellement de 30-50 m et pouvant atteindre 100 m pour la fauvette à tête noire. Les merles peuvent couvrir un plus vaste espace de recherche, allant chercher des insectes parfois à 300m du nid ! Certes, ici, les gastéropodes ont fini dans le ventre des poussins. Cependant, lors du transport ou lors de la distribution au nid, certaines proies peuvent tomber, et pourraient survivre pour peu que le milieu en-dessous s'avère favorable. Les auteurs avancent que le transport par oiseaux pourrait expliquer comment des individus d'espèces comme *Succinea putris* (Succineidae) et *Perforatella bidentata* (Hygromidae) s'observent parfois dans des milieux qui ne sont absolument pas leur biotope de prédilection.

Shikov & Vinogradov, 2013. Dispersal of terrestrial gastropods by birds during the nesting periods. *Folia malacologica* **21**, 105–110.

Gastéropodes	Potamididae	Ecologie/biogéographie	Zoochorie/dispersion	News 32
--------------	-------------	------------------------	----------------------	---------

Les escargots voyagent par les oiseaux: comment franchir l'Isthme du Panama

Cerithideopsis californica et *C. pliculosa* sont deux espèces sœurs qui vivent au niveau de l'estran des mangroves de l'Amérique centrale; mais la première vit sur la côte pacifique, la seconde sur la côte atlantique. Leur ancêtre commun remonte à l'époque où l'isthme du Panama ne s'était pas encore fermé, séparant les océans Pacifique et Atlantique il y a 3 MA. Il s'agit typiquement de la formation de deux espèces allopatriques par séparation géographique de deux populations d'une espèce ancestrale, et qui sont maintenant clairement identifiables génétiquement. A l'heure actuelle, les deux espèces sont séparées non pas que par un isthme, mais également par une chaîne de montagne. La question s'est alors posée de savoir si ces populations avaient depuis été clairement séparées depuis 3 MA, dont la réponse peut s'obtenir par une analyse génétique. Et là, surprise, des échanges de gènes ont bien eu lieu entre les deux espèces. Comment ? Pas par l'homme, car ces échanges dates de bien avant sont arrivées. Les chercheurs ont mis en évidence deux événements. Le premier remonte à 750 000 ans où des gènes de l'espèce pacifique ont « contaminé » l'espèce atlantique. En d'autres mots, au moins un individu (peut-être plus) a passé l'obstacle, et s'est reproduit avec l'espèce locale, et a généré des descendants détectables dans certaines populations actuelles. Un second événement similaire vers 72000 ans a été aussi mis en évidence, mais cette fois dans l'autre sens, au moins un individu atlantique a franchi l'insurmontable. La seule hypothèse plausible de ces sauts serait un transport passif via des oiseaux. Des oiseaux ayant avalé ces mollusques, se seraient déplacés sur l'autre côte, le temps d'un passage dans le tractus digestif pour le mollusque. Hors, il a été constaté que *C. californica* était capable de survivre à un tel passage dans le ventre d'un oiseau échassier (Sousa, 1993).

Sousa, 1993. Size-dependent predation on the salt-marsh snail *Cerithidea californica* Haldeman. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* **166**, 19–37. **Miura et al.**, 2015. Flying shells: historical dispersal of marine snails across Central America. *Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences* **279**, 1061–1067.

Gastéropodes	Achatinellidae	Ecologie/biogéographie	Zoochorie/dispersion	News 33
--------------	----------------	------------------------	----------------------	---------

Les escargots voyagent par les oiseaux: endozoochorie sur l'île de Haha' Jima

Le cas de transport par des *Cerithideopsis* via ingestion par les oiseaux n'est pas un cas unique. Alors que chez ces espèces, l'événement détecté était très rare, au Japon, une autre espèce semble recourir fréquemment à ce mode de dispersion. *Tornatellides boeningi* (Achatinellidae) est un gastéropode terrestre minuscule de 2.5 mm vivant sur une île de l'archipel d'Ogasawara. Des chercheurs ont constaté que 15% des individus consommés par deux oiseaux locaux (le zosterops du Japon – *Zosterops japonicus* – et le bulbul à oreillons bruns – *Microscelis amaurotis*) survivait dans les fèces. Leur épiphragme (mucus séché fermant l'entrée de la coquille pour éviter notamment de souffrir d'un stress hydrique) serait assez efficace pour protéger des sucs digestifs. Ces mollusques seraient alors disséminés là où ces oiseaux déposent leurs fientes. Hors une analyse génétique des populations de cet escargot insulaire montre que leur génome est étonnamment homogène (quasi pas de différence entre population éloignée). Ceci s'expliquerait par le flux génétique important entre les populations dû à la dissémination par les oiseaux. Signalons aussi que la probabilité de survie est plus grande pour les plus petits spécimens. D'autres espèces plus grandes sont simplement écrasées lors de leur passage dans le ventre de l'oiseau.

Wada et al., 2012. Snails can survive passage through a bird's digestive system. *Journal of Biogeography* **39**, 69–73.

Gastéropodes	terrestres	Ecologie/biogéographie	Zoochorie/dispersion	News 34
--------------	------------	------------------------	----------------------	---------

Des gastéropodes terrestres de moyennes tailles survivent au tract digestif d'oiseaux

Nous avons vu que des espèces minuscules étaient capables de survivre à la consommation par des oiseaux. Quant est-il d'espèces plus grandes (7-17 mm)? Une équipe tchèque a nourri 10 espèces d'oiseaux de nos régions (corbeaux, pies, merles, étourneaux, ...) avec des spécimens de *Discus rotundatus*, *Alinda biplicata* et *Cochlodina Laminata*. Sur 720 mollusques offerts en repas, 14 ont passé le tractus digestif de diverses espèces au complet dont 9 étaient survivants (8 clausilides et 1 *Discus*), soit donc plus de 1% de taux de survie ! Cette même équipe a testé aussi des nourrissements avec des *Vertigo sp* et *Carychium sp.* comme témoin positif, car une étude précédente (news 33) suggérait que les petites espèces avaient plus de chance de survie ; mais aucune de leur coquille ne fut retrouvée dans les fèces des oiseaux. D'autres facteurs que simplement la taille de l'escargot influencent donc le taux de survie (par ex. capacité de fermeture de la coquille, l'épaisseur de la coquille, ...). Cette équipe a aussi simulé des vols d'oiseaux dans lesquels des spécimens de clausilides arrivaient à se maintenir à leurs pattes malgré les mouvements de l'oiseau, illustrant un possible autre moyen de dispersion passive par les oiseaux (ectozoochorie).

Simonová et al., 2016. Medium-sized forest snails survive passage through birds' digestive tract and adhere strongly to birds' legs: more evidence for passive dispersal mechanisms. *Journal of Molluscan Studies* **82**, 422–426.



Ce goéland marin (*Larus marinus*) transporte un *Mercenaria mercenaria* (Veneridae). Le but de l'oiseau est ici de lâcher le coquillage à une hauteur de plusieurs mètres pour qu'il s'éclate en s'écrasant sur la plage. (scène photographiée par J.D. à Rockaway Beach, NY, USA).



E. adansonianus adansonianus (Crosse & Fischer, 1861), Bahamas, 106.1 mm. *M. anseeuwi* (Kanazawa & Goto, 1991), Philippines, 111.4 mm. *P. amabilis f. maureri* Harasewych & Askew, 1993, USA, 42 mm. *B. tangaroana* (Bouchet & Métivier, 1982), New Zealand, 55.9 mm. *P. quoyanus* (Fischer & Bernardi, 1856), Curaçao, 50.7 mm. *B. philpoppei* Poppe, Anseeuw & Goto, 2006, Philippines, 65.1 mm. *B. charlestonensis* Askew, 1987, Martinique, 77.3 mm. *B. midas* (Bayer, 1965), Bahamas, 82.7 mm.

YOUR CONCHOLOGICAL HOME ON THE NET

150,000 pictured specimens of common and rare shells for **your collection**.

Conchology, Inc. continues to develop its conchological goals by supplying worldwide collectors with the best quality and the best documented shells. Conchology, Inc. is powered by Guido and Philippe Poppe together with a dedicated staff of 24.

www.conchology.be

philippe@conchology.be



FERNAND & RIKA DE DONDER
Melsbroeksestraat 21
1800 Vilvoorde - Peutie
BELGIUM

Tel : +32 (0)2 253 99 54

Fax : +32 (0)2 252 37 15

e-mail : fernand.de.donder@pandora.be

WORLDWIDE SPECIMEN SHELLS

10 Minutes from Brussels Airport. Visitors welcome.

All Families from the very common to the ultra rare, specialized in Pectinidae, Philippine shells and European shells.

Free list on request, good quality shells at the best prices. Satisfaction guaranteed !

PHILLIP W.CLOVER

P.O.BOX 339

GLEN ELLEN CA. 95442 USA


TEL/FAX# 707 996 6960

clovershells@juno.com

DEALER IN WORLD WIDE SPECIMEN
SEA SHELLS SINCE 1960, SPECIALIZING
IN RARE & COMMON CYPRAEA, CONUS,
VOLUTA, MUREX, MITRA, EPITONIUM, LATIAXIS, OVULA
PLEUROTOMARIA, PECTENS, ETC. ALSO CURRENT AND
OUT OF PRINT SHELL BOOKS. FREE PRICE LISTS ON REQUEST



*Si vous passez commande chez l'un
de nos annonceurs, n'oubliez pas de
préciser que vous avez trouvé son
annonce dans Novapex/Société !!!*



Club Conchylia

e.V.

German Shell Collector's Club

Our journals:

- Conchylia
- Acta Conchylorum
- Mitteilungen

Yearly membership

(incl. our publications and free shipment): 50 €


Visit our site:

www.club-conchylia.de

Further information:

Manfred Herrmann
Ulmenstr. 14
37124 Rosdorf
Germany

club-conchylia@gmx.de



Excursion de printemps du 13 mai 2017 à Merbes-le-Château

Christiane DELONGUEVILLE & Roland SCAILLET

Le samedi 13 mai, les membres de la Société Royale Belge de Malacologie ainsi qu'un couple de visiteurs de Mouscron, se sont réunis pour leur excursion de printemps aux abords de la réserve naturelle de « Labuissière ». Le lieu de rendez-vous avait été fixé à la gare de Solre-sur-Sambre. Dans l'attente de réunir le groupe au complet, certains ont arpenté le quai de la gare dont le sol était couvert de centaines de Clausilies (*Balea biplicata* - Fig. 1).



Figure 1. Gare de Solre-sur-Sambre, son quai pavé, *Cepaea nemoralis* et ses clausilies !

Quelques dizaines de minutes plus tard, enfin tous réunis, le « local de l'étape », Didier Bertin, s'est chargé de nous guider vers notre principal lieu de prospection, le confluent de l'Hantes et de la Sambre (Fig. 2D). Nul n'est besoin de franchir les limites de la réserve pour trouver des milieux favorables à la prospection. Un chemin bordé d'une luxuriante végétation serpente entre un chapelet de plans d'eau et de prairies inondables (Fig. 2B-C), passe sous la ligne de chemin de fer et se termine sur un petit pont en ruine franchissant l'Hantes (Fig. 2A). C'est sous le soleil et au son des chants d'oiseaux et des croassements des grenouilles que le groupe a passé la végétation au crible, une fois dans un sens, puis dans l'autre (Fig. 2E) pour finalement rejoindre les véhicules et se déplacer de quelques centaines de mètres pour prospecter deux parois murales faites de gros moellons. Ces recherches ont eu lieu rue des Usines et au coin de la rue Sous-Bois. Nos spécialistes des mollusques terrestres, Claude Vilvens, Etienne Meuleman, Didier Bertin et Marc Alexandre, (Fig. 2E) ont prodigué tout leur savoir sur place pour identifier les espèces rencontrées. Certains spécimens ont été emportés pour que Rony Maes effectue les déterminations chez lui sous binoculaire, celui-ci est même revenu ultérieurement sur le terrain pour ajouter 14 espèces à celles récoltées initialement. C'est là que les fascicules* publiés par notre association trouvent toute leur utilité. L'inventaire a été particulièrement productif, c'est ainsi qu'ont pu être identifiés 39 espèces de gastéropodes à coquille (31 terrestres et 8 dulcicoles), 4 espèces de limaces et un bivalve. Toutes les espèces, à l'exception de 15 ont été observées vivantes (Tableau 1).

La balade s'est terminée peu avant midi et tout le groupe s'est retrouvé dans la maison de Didier à Merbes-le-Château. Ce fut l'occasion d'y prendre l'apéro et d'y déterminer nombre de mollusques marins apportés dans ce but par nos visiteurs de Mouscron. Nous nous sommes ensuite sustentés à l'italienne (merci madame Bertin) et nous avons visité le « cabinet de conchyliologie » de notre ami Didier. L'espace consacré à sa collection est vaste et occupe plusieurs pièces, ce qui n'a pas manqué de rendre envieux ses amis collectionneurs vivants en appartement. Dans l'espoir que cette visite ait suscité l'envie chez l'un d'entre nous de réaliser un petit reportage à publier dans la rubrique « visite chez un collectionneur »...

Remerciements à Claude Vilvens pour la relecture du texte et la confirmation des déterminations.

* *Mollusques terrestres et dulcicoles de Belgique* (2014) Claude Vilvens et al. Société Belge de malacologie
Gastéropodes terrestres à coquille (Tome I et II), *Gastéropodes terrestres sans coquille* (Tome III), *Gastéropodes dulcicoles* (Tome IV) et *Bivalves dulcicoles* (Tome V).

Tableau 1.

Noms scientifiques	Ter.	Dulci.	Fig.	M.	Noms vernaculaires
<i>Acanthinula aculeata</i> (O.F. Müller, 1774)	X			X	Vallonie hérissée
<i>Aegopinella nitidula</i> (Draparnaud, 1805)	X				Grande luisantine
<i>Aegopinella pura</i> (Alder, 1830)	X			X	Petite luisantine
<i>Anisus leucostoma</i> (Millet, 1813)		X			Planorbe leucostome
<i>Arianta arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	X		3A		Hélice des arbustes
<i>Arion rufus</i> (Linnaeus, 1758)	X				Arion rouge
<i>Arion subfuscus</i> (Draparnaud, 1805)	X		3D		Arion brunâtre
<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	X		3L		Loche vulgaire
<i>Balea biplicata</i> (Montagu, 1803)	X		3G		Clausilie à deux plis
<i>Bithynia tentaculata</i> (Linnaeus, 1758)		X			Bithynie impure
<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)	X			X	Auriculette commune
<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	X		3C		Escargot des bois
<i>Cepaea hortensis</i> (O.F. Müller, 1774)	X		3J		Escargot des jardins
<i>Clausilia bidentata</i> (Ström, 1765)	X				Clausilie noirâtre
<i>Clausilia rugosa parvula</i> (A. Férussac, 1807)	X				Clausilie naine
<i>Cochlicopa lubrica</i> (O.F. Müller, 1774)	X			X	Bulime brillant
<i>Cochlodina laminata</i> (Montagu, 1803)	X				Clausilie lisse
<i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)	X			X	Maillot édenté
<i>Deroceras reticulatum</i> (O.F. Müller, 1774)	X		3N		Limace réticulée
<i>Discus rotundatus</i> (O.F. Müller, 1774)	X		3H		Hélice bouton
<i>Fruticicola fruticum</i> (O.F. Müller, 1774)	X				Hélice des buissons
<i>Galba truncatula</i> (O.F. Müller, 1774)		X			Limnée tronquée
<i>Hygromia cinctella</i> (Draparnaud, 1801)	X		3K		Hélice carénée
<i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778)	X			X	Maillot ombiliqué
<i>Merdigera obscura</i> (O.F. Müller, 1774)	X			X	Bulime obscur
<i>Monacha cantiana</i> (Montagu, 1803)	X		3F		Hélice du Kent
<i>Monacha cartusiana</i> (O.F. Müller, 1774)	X				Hélice chartreuse
<i>Monachoides incarnatus</i> (O.F. Müller, 1774)	X				Moine des bois
<i>Nesovitrea hammonis</i> (Ström, 1765)	X			X	Zonite strié
<i>Oxychilus cellarius</i> (O.F. Müller, 1774)	X		3B		Zonite des caves
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (J.E. Gray, 1843)		X			Hydrobie des antipodes
<i>Pyramidula rupestris</i> (Draparnaud, 1801)	X			X	Pyramidule des rochers
<i>Sphaerium corneum</i> (Linnaeus, 1758)		X	3E		Cyclade cornée (bivalve)
<i>Sphyradium doliolum</i> (Bruguière, 1792)	X			X	Maillot barillet
<i>Stagnicola corvus</i> (Gmelin, 1791)		X			Limnée d'Europe
<i>Stagnicola palustris</i> (O.F. Müller, 1774)		X			Limnée palustre
<i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)	X		3M		Ambrette amphibie
<i>Trochulus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	X		3I		Hélice veloutée
<i>Vallonia costata</i> (O.F. Müller, 1774)	X			X	Vallonie à côtes
<i>Valvata cristata</i> O.F. Müller, 1774		X			Valvée planorbe
<i>Vertigo moulinsiana</i> (Dupuy, 1849)	X			X	Vertigo de Des Moulins
<i>Vertigo pusilla</i> O.F. Müller, 1774	X			X	Maillot pusille
<i>Vitrina pellucida</i> (O.F. Müller, 1774)	X			X	Vitrine d'hiver
<i>Zonitoides excavatus</i> (Alder, 1830)	X			X	Luisantine à grand ombilic

Abréviations : **Ter.** Gastéropodes terrestres - **Dulci.** Coquilles dulcicoles - **Fig.** Figure - **M.** Mort




Figure 2. A. Vestiges d'une passerelle franchissant l'Hantes. B. Etang et église de Labuissière vus du chemin de prospection. C. Un des étangs du site. D. Topographie des lieux. E. La SRBM au travail : de gauche à droite : Roland Scaillet, Marc Alexandre accompagné du petit fils de Dider Bertin, sa fille, Etienne Meuleman, Claude Vilvens et Rony Maes en pleine activité de détermination ainsi que nos deux accompagnants les yeux rivés au sol à la recherche de nos chers mollusques.



Figure 3. A. *Arianta arbustorum* (Linnaeus, 1758) B. *Oxychilus cellarius* (O.F. Müller, 1774) C. *Cepaea nemoralis* (Linnaeus, 1758) D. *Arion subfuscus* (O.F. Müller, 1774) E. *Sphaerium corneum* (Linnaeus, 1758) F. *Monacha cantiana* (Montagu, 1803) G. *Balea biplicata* (Montagu, 1803) H. *Discus rotundatus* (O.F. Müller, 1774) I. *Trochulus hispidus* (Linnaeus, 1758) J. *Cepaea hortensis* (O.F. Müller, 1774) K. *Hygromia cinctella* (Draparnaud, 1801) L. *Arion vulgaris* (Moquin-Tandon, 1855) M. *Succinea putris* (Linnaeus, 1758) N. *Deroceras reticulatum* (O.F. Müller, 1774).

Terrestres d'Europe (III)

Espèces provenant toutes du
Péloponnèse (Grèce continentale)



Cochlostoma achaicum
(Boettger, 1885)
- 13.5x5.5 mm



Lindholmiola lens (Férussac, 1832)
- 6x13 mm



Albinaria profuga (Charpentier, 1852)
- 19x5 mm



Eobania vermiculata (Müller, 1774)
- 27x32 mm



Codringtonia eucineta (Bourguignat, 1857)
- 35x55 mm



Albinaria schuchii olympica
Nordsieck, 1974
- 19x4.9 mm

[Claude Vilvens]

Terrestres d'Europe (IV)

Espèces provenant toutes des
Cyclades (Grèce)

Albinaria caerulea
(Deshayes, 1835)
- 17x3.5 mm



Xerocrassa cretica (Férussac, 1821)
- 15x18 mm



Rumina saharica Pallary, 1901
- 30x9.5 mm



Cochlicella) acuta
(Müller, 1774)
- 16x4.5 mm



[Claude Vilvens]

S.R.B.M. 29 avril 2017 - Thème : la coquille sénestre



Newtoniellidae
Laecochlis sinistratus
(Nyst, 1835)
Islande S.O.
18,6 x 6,0 mm




Buccinidae
Neptunea contraria (Linnaeus, 1771) Póvoa de Varzim (P)
60,4 x 26,8 mm




Triphoridae
Similiphora tricolorata
Bouchet, 1997
Marbella (E)
4,5 x 1,5 mm



Buccinidae
Pyrulofusus deformis
(Reeve, 1847)
Diskobukta (Svalbard - N)
80,4 x 47,7 mm



Limacinidae
Limacina helicina (Phipps, 1774)
Ex Sars G. O. (1878)
Mollusca Regonis Arcticae Norwegiae
Planche 29 - Fig. 1 a



Buccinidae
Buccinum undatum Linnaeus, 1758
Sénestre occasionnel
Mer du Nord 64,0 x 39,0 mm

Quelques exemples européens marins

Collection Delongueville & Scaillet



Nous avons reçu

Etienne MEULEMAN

LES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE

(Belgique)

N°294, mars-avril 2017 - N°295, mai-juin 2017 - N°296, juillet-août 2017

Divers articles et observations naturalistes, mais pas de mollusques.



GLORIAMARIS

(Belgique)

Vol. 55, N°2, janvier 2017

Scientific contributions

1. *F. Verhaeghe & N. Severijns*
Mollusken in het Bos t' Ename te Oudenaarde: Inventarisatie van de biodiversiteit in het Bos t'Ename in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos
2. *N.N. Thach & J. Abbas*
Amphidromus lucsegersi, a new species (Gastropoda: Camaenidae) from Indonesia

Life of the society

- The 4th International Cone Meeting Brussels, Belgium 30 September – 2 October 2016 (*A. Monteiro*)
- Activiteitenkalender 2017
- Lidgeld 2017

Vol. 55, N°3, février 2017

Scientific contributions

1. *C. Schoenherr & E. Rolán*
The first new species of the genus *Euthria* (Mollusca, Buccinidae) from Angola
2. *K. Fraussen & P. Stahlschmidt*
Comparing the living eastern Atlantic *Euthria* Gray, 1839 (Gastropoda: Buccinoidea), with brief remarks on the paleontological and biogeographical context
3. *E. Rolán & J.D. Oliver*
On the synonymy of a species from the Mediterranean Neogene and the Recent fauna from Angola
4. *E. Rolán & F. Rubio*
A new *Ammonicera* (Hétérobranchia, Omalogyridae) from the Red Sea

Life of the society

- Voorlopig verslag Slak-In-Du staalnames in het Dir. Gen. Willems Park te Knokke-Heist op 10 en 14 april 2015 (*F. Bauwens*)
- Prize "Una Vita per la Malacologia 2016" awarded to Nathal Severijns, president of the Royal Belgian Society for Conchology (Kon.BVC)
- In Memoriam Pol Vanhoeck (*A. Delsaerdt*)

Vol 55, N°4, mai 2017

Scientific contributions

1. *G.C.S. Malcolm & Y. Terry*
A new species of *Hastula* (Gastropoda: Terebridae) from Indonesia
2. *D. Monsecour, K. Fraussen & W. Fei*
A new *Kanamarua* (Gastropoda: Colubrariidae) with a remarkable shape from the Spratly Islands, South China Sea
3. *K. Fraussen & C. Vanleke*
A giant *Nucella lapillus* (Linnaeus, 1758) (Muricidae) from the Holocene of the Outer Thames Estuary
4. *C. Vanleke & K. Fraussen*
Exotic shells in our seas
5. *N.N. Thach & J. Abbas*
Amphidromus stevehubrechtii, a new species (Gastropoda: Camaenidae) from Indonesia
6. *N.N. Thach & F. Hubert*
A new species of *Amphidromus* Albers, 1850 (Gastropoda: Camaenidae) from Vietnam

Life of the society

-Voorlopig verslag excursie Slak-In-Du van 28 juni 2015 in de Warandeduinen te Middelkerke

N°56, N°1, mai 2017

Scientific contributions

1. *R. Houart*
Description of a new species of *Tenguella* (Gastropoda: Muricidae: Ergalataxinae) from Oman
2. *A. Delsaerdt*
Conidae from the Solomon Islands: some taxonomic problems
3. *C. Vilvens & F. Swinnen*
A new record and a new species of *Calliostoma* (Gastropoda: Trochoidea: Calliostomatidae) from southwestern Mediterranean Sea and adjacent Atlantic area

Life of the society

-Verslagen werkjaar 2016



(France)
N°158, avril 2017

- 4 Le concert des Harpes d'Unguja
par M. et J-P Lacroix
 - 20 Auteurs et holotypes MNHN 2015
 - 22 Les mollusques marins : comment les nettoyer
et les conserver par M. Antit, S. Gofas
et A. Azouna
 - 26 Le *Turbo marmoratus* dans tous ses états
par P.Marti
 - 29 Reçu au Club par P. Bail
 - 31 Combien d'espèces de mollusques y a-t-il dans
les océans et qui va les décrire ?
 - 32 Liste des Espèces marines décrites dans
Xenophora Taxonomy par A. Robin
 - 34 Bonne Année MNHN
 - 39 Echo...coquillages
- Supplément : *Xenophora Taxonomy* 14

XENOPHORA TAXONOMY

(France)
N°15, avril 2017



Astrangaria, un nouveau genre d'Angariidae (Mollusca, Gastropoda)
des calcaires daniens (Paléocène inférieur) du bassin de Paris
J-M. PACAUD

Révision de la sous-famille des Rissoininae (Caenogastropoda, Rissoinidae) des Antilles françaises.
Descriptions de sept nouvelles espèces.
G. PAULMIER

Muricidae récoltés en Guyane au cours de l'expédition La Planète Revisitée
B. GARRIGUES & D. LAMY


Erronea caurica mayottensis : une nouvelle sous-espèce décrite de Mayotte
P. VACHON & N. VERNEAU

Un cas d'espèces jumelles allotopiques : *Marginella festiva* Kiener, 1841 et *M. bavayi* Dautzenberg, 1910
F. BOYER

SPIRULA

(Pays-Bas)

N° 411, été 2017



Diverse bronnen	Excursies en malacologische agenda Nederland	1
Breure, A.S.H.	Een expeditie naar de Neotropen: reconstructie van Arthur Morelet's reis naar Centraal-Amerika, 1846-1848.	4
Dekkers, A.	Patella's en landslakken verzamelen op Madeira.	11
Loeff, H.	Even voorstellen: Hester Loeff.	17
Kerstes, N.	Kunnen tuinslakken zich snel genoeg aanpassen aan klimaatverandering? Draag bij aan wetenschappelijk onderzoek met de SnailSnap-app!	18
Kouwenhoven, M.	Opengebroken Quaggamossels <i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov, 1897): sporen van de Bruine rat, <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1759)?	19
Majoor, G.	De Stompe grondwaterslak <i>Avenionia roberti</i> Boettgers, 1967 in het Jekerdal met de begeleidende molluskenfauna.	21
Hendrickx, J.	Hazelworm <i>Anguis fragilis</i> en Gevlekte akkerslak <i>Deroceras reticulatum</i>	26
Raven, J.G.M.	Mooie vondsten na de storm van 13 januari 2017 en reflecties op veranderingen in de kustfauna van Zuid-Holland	27
Reijnen, B.T. & S. E.T. van der Meij	De veelkleurige mantel van <i>Cyphoma gibbosum</i> (Linnaeus, 1758) (Ovulidae)	35
Twigt, A.	Vondst van <i>Isognomon radiatus</i> (Anton, 1838), vlak na de vondst van een familielid	39
Van Gemert, L.J.	Een struikelsteentje voor Elly Koperberg (1897-1943)	43
Van Gemert, L.J.	Wie gaat er nou naar Libanon om schelpen te verzamelen?	45
Van de Woestijne, C.	Een schelpenproject op de basisschool.	49
Faber, W.	Nieuw beschreven mariene molluskensoorten	53
Breure, A.S.H.	Nieuw beschreven continentale molluskensoorten	55
Faber, W.	Tijdschriftartikelen: mariene malacologie	57
Breure, A.S.H.	Tijdschriftartikelen: continentale malacologie	64
Faber, W.	Schelpenbeurzen en bijeenkomsten	71
Faber, W. & A.S.H. Breure	Nieuwe boeken	71

MISCELLANE MALCOLOGICA

(Pays-Bas)

Vol. 7, N° 2, mars 2017



Gili, C. Additional data on <i>Nassarius rainbowae</i> Gili, 2015 (Neogastropoda: Nassariidae).	25
Faber, M. J. A replacement name for <i>Rissoina expansa</i> Carpenter, 1865 non Deshayes, 1864 (Gastropoda: Rissoinidae).	28
Stahlschmidt, P & K. Fraussen. Description of <i>Inquisitor ritae</i> new species from the Philippines (Conoidea: Pseudomelatomidae).	29
Faber, M. J. A new species of <i>Zebina</i> H. Adams & A. Adams, 1854 from Barbados (Gastropoda: Zebinidae).	33
Faber, M. J. A replacement name for <i>Rissoina bouryi</i> Desjardin, 1949 non Cossman, 1888 (Gastropoda: Rissooidea).	36
Gili, C. Contributions to the knowledge of <i>Nassarius absconditus</i> Gili, 2015 (Gastropoda, Nassariidae).	37

Vol. 7, N° 3, avril 2017

Gili, C. Further observations on the synonymy of *Nassarius reeveanus* (Dunker, 1847) with a revalidation of *N. luctuosus* (A. Adams, 1852) and *N. punctatus* (A. Adams, 1852). 41

Faber, M. J. A replacement name for *Rissoina cancellata* Morris & Lycett, 1850 non Philippi, 1847 (Gastropoda: Rissoinidae). 48


Gulden, G. J., R. G. Moolenbeek & J. Goud. A new *Lautoconus* (Gastropoda; Conidae) from Senegal. 49

Faber, M. J. Friedrich Rolle's interpretation of Darwin's work on the origin of species: a little known publication of malacological interest (Mollusca: Gastropoda, Polyplacophora). 54

BASTERIA

(Pays-Bas)

Vol. 35, N° 1, janvier 2017

*Iberus*

35 (1) 2017

- BORREDÀ V. & MARTÍNEZ-ORTÍ A. Contribution to the knowledge of the terrestrial slugs (Gastropoda, Pulmonata) of the Maghreb
Contribución al conocimiento de las babosas terrestres (Gastropoda, Pulmonata) del Magreb . 1-10
- BREURE, A.S.H. & BACKHUYS W. Science networks in action: the collaboration between J.G. Hidalgo and H. Crosse, and the creation of 'Moluscos del Viaje al Pacífico, Univalvos terrestres'
Antiguas redes científicas en acción: la colaboración entre J.G. Hidalgo y H. Crosse y la creación de 'Moluscos del Viaje al Pacífico, Univalvos terrestres' 11-30
- RUBIO F. & ROLÁN E. *Circuitus*, a new genus of the family Tornidae (Gastropoda, Truncatelloidea) with the description of six new species
Circuitus, un nuevo género de la familia Tornidae (Gastropoda, Truncatelloidea) con la descripción de seis nuevas especies 31-46
- OLIVER J.D. & ROLÁN E. A new species of the genus *Benthonellania* (Gastropoda, Rissoidae) from the Cape Verde archipelago
Una nueva especie del género Benthonellania (Gastropoda, Rissoidae) del archipiélago de Cabo Verde 47-57
- QUINONERO-SALGADO S., RUIZ-COBO J. & ROLÁN E. Three new species of *Spiralix* (Burgosia) (Gastropoda, Moitessieriidae) from the northern Iberian Peninsula
Tres nuevas especies de Spiralix (Burgosia) (Gastropoda, Moitessieriidae) del norte de la Península Ibérica 59-70
- HOLYOAK G.A., HOLYOAK D.T. & DA COSTA MENDES R. Descriptions of two new species of *Belgrandia* (Gastropoda: Hydrobiidae) from Central Portugal
Descripción de dos nuevas especies de Belgrandia (Gastropoda: Hydrobiidae) del centro de Portugal 71-83

Notas breves

- PRIETO C.E. & GÓMEZ-MOLINER B.J. Nuevos datos de distribución de *Cryptazeca spelaea* Gómez, 1990 (Pulmonata, Azecidae)
New data on the distribution of Cryptazeca spelaea Gómez, 1990 (Pulmonata, Azecidae) .. 85-89

MALACOLOGIA (MOSTRA MONDIALE)

(Italie)

N°94, janvier 2017

N°95, mars 2017



De nombreux petits articles sur les Helicidae, Turbinellidae, Conidae, Marginellidae, Olividae, Fasciariidae,...

TRITON

(Israël)

N°34, décembre 2016

**1. GENERAL****Singer, B.S.**

The end of an era - Abraham Singer ardent shell collector, is no more 1

Mienis, H.K.

Malacological publications of Abraham Singer and eponyms in his honor 2

2. MARINE MOLLUSCS**Gemert, L.J. van**

Some notes on Haliotids from the Sultanate of Oman 3

Gemert, L.J. van*Parashiela ambulata* Laseron, 1956 (Mollusca: Rissoidae) new for the Red Sea, with a survey of the records of all *Parashiela* species 6**Cachia, Ch. & Mifsud, C.**First record of a sinistral *Granulina melitensis* Smriglio, Mariottini & Rufini, 1998 (Marginellidae: Cystiscinae) 10**Mienis, H.K., Ilan, M., Shefer, S., Idan, T., Weinberger, A., Ashkenazi, A. & Levy, M.**A first observation of the nudibranch *Felimare orsinii* in the Mediterranean off Israel (Mollusca, Gastropoda, Chromodorididae) 11**3. LAND AND FRESHWATER MOLLUSCS****Okon, M.E.**

Another scalarid land snail from Israel/Palestine 13

Mienis, H.K. & Rittner, O.Brief review of the freshwater Ark shells belonging to the genus *Scaphula* Benson, 1834 (Fam. Arcidae) 16**Mienis, H.K., Rittner, O., Hershkovitz, Y. & Eshcoly, T.**A first record of the Marsh hive *Euconulus praticola* from Israel (Gastropoda, Pulmonata, Euconulidae) 21**Mienis, H.K.**Some additional information concerning the possible presence of *Rumina saharica* in Menton 24**Mienis, H.K., Rittner, O., Hershkovitz, Y., Eshcoly, T. & Uekötter, L.**A new exotic freshwater snail: the New Zealand mudsnail *Potamopyrgus antipodarum*, in Israel (Mollusca, Gastropoda, Tateidae) 25**Mienis, H.K., Rittner, O. & Vaisman, S.**Information concerning *Eobania vermiculata*, I. On the presence of this exotic species in Israel (Mollusca, Gastropoda, Helicidae) 29

N°35, mars, 2017

1. MARINE MOLLUSCS**Ovalis, P. & Mifsud, C.**

- A new species of *Turbonilla* (Risso, 1826) from SE Turkey (Pyramidellidae: Turbonillinae)..... 1

Cachia, Ch. & Mifsud, C.

- A third *Chama* species in Maltese waters?..... 5

Okon, M.E.

- Subspecies in Cypraeidae: the case for the prosecution..... 7

Geyzner, A., Rothman, S. & Mienis, H.K.

- An encounter with the pelagic nudibranch *Phylliroe bucephala* off Akhziv, Israel (Mollusca, Gastropoda, Phylliroidae)..... 11

Mienis, H.K.

- Palisadia rittneri*, a new species from the Gulf of Aqaba (Mollusca, Gastropoda, Eulimidae)..... 13

2. LAND AND FRESHWATER MOLLUSCS**Mienis, H.K., Rittner, O. & Vaisman, S.**

- Information concerning *Eobania vermiculata*, II. On the presence of extra-territorial material in the National Mollusc Collections in Israel (Mollusca, Gastropoda, Helicidae) 15

Mienis, H.K. & Rittner, O.

- A contribution to the identity of the mysterious *Helicella (Xerocrassa) seetzeni scharonica* (Mollusca, Gastropoda, Hygromiidae)..... 23

Mienis, H.K.

- Xerocrassa zviae*, a new species of land snail from the Judean Desert, Israel (Mollusca, Gastropoda, Hygromiidae)..... 25

3. ARCHAEOMALACOLOGY**Mienis, H.K.**

- A final report concerning the molluscs from the PPNB-site of Motza, Judean Hills, Israel..... 29

AMERICAN CONCHOLOGIST

(U.S.A. Sud-Est)

Vol. 45, N° 1, mars 2017



Editor's comments	3
Conchologists of America: 45 years old by Tom Eichhorst	4
The history of a shell: <i>Phenacovolva lenoreae</i> by Jerry G. Walls	8
2017 SHELL SHOWS & RELATED EVENTS (January – August) by Donald Dan	12
Pond snail chirality by Tom Eichhorst	13
Dealer Directory	14
Heterobranch sea slugs of Bocas del Toro, Panama by Jessica Goodheart	17
Book review of <i>Tropical Deep-Sea Benthos</i> , Vol. 29 ----	20
Book review of <i>Cassidae: An Amazing Family of Seashells</i>	22
Book review of <i>Neritidae of the World - Volumes One & Two</i>	23
The <i>Lei Pupu o Ni'ihau</i> by Betty Ruggeri	24

Broward Shell Show - 14-15 Jan 2017	28
Sarasota Shell Show - 3-5 Feb 2017	30
Good work ultimately reaps its (his) reward by Harry Lee	32
In Memoriam	35
Key West COA Convention & the Frederic Weiss collection – 15-19 Aug 2017 by Thomas Eichhorst ----	36
Shell collector – Frederic Weiss (1929-2015) by Emily Weiss	38
Highlights of the 2017 COA Convention – Key West, FL August 13-14 – Field Trips August 15-19 – Convention & Bourse By Jeannette Tysor and Ed Shuller	39
A closing look at COA Chicago - 2016	40
COA <i>Neptunea</i> Award by Everett Long	43

THE FESTIVIUS

(Etats-Unis)

Vol. 49, N° 1, février 2017

**Peer Reviewed Articles**

- Narrow-range taxa of *Cerion* (Mollusca: Cerionidae) in the northeastern p. 3
province of Cuba
By Adrián González-Guillén, Alejandro Fernández-Velázquez, Luis A.
Lajonchere-Ponce de León, and David P. Berschauer
- Haliotis kamtschatkana* Jonas, 1845 – a Single Species, not a Pair of Subspecies p. 18
By Buzz Owen and Arjay Raffety
- "A three hour tour" - Reflections on Shelling Sint Maarten as a Port During a Cruise p. 33
By David P. Berschauer
- An Iconography of *Haliotis volhynica* Eichwald, 1829, and description of a new p. 39
species of *Haliotis* from the middle Miocene of Ukraine
By Buzz Owen and David P. Berschauer
- Three New Gastropods (Cypraeidae, Fasciolaridae, and Volutidae) from the p. 45
Great Australian Bight
By Edward J. Petuch, David P. Berschauer, and David B. Waller
- Two New Genera of Olive Shells (Gastropoda: Olividae) p. 52
By Edward J. Petuch and David P. Berschauer

Club News p. 56**Articles of General Interest**

- Shelling and Molluscan Photography in Northern California and Oregon p. 57
By Robyn Waayers
- Curious Shell Stories p. 64
By William Schramm
- In Memoriam - Margaline Lee Lindahl p. 67
By Lisa Dawn Lindahl
- Book Review: Vietnamese New Mollusks - Sea shells, Land snails, p. 68
Cephalopods With 59 New Species
By David P. Berschauer
- In Memoriam: William K. Emerson (1925–2016) p. 69
By Paula M. Mikkelsen and Neil H. Landman
- 2016 San Diego Shell Club Holiday Party p. 71
By Lisa Dawn Lindahl
- James Hamilton McLean 1936-2016: Master of the Gastropoda p. 73
By Lindsey T. Groves

TABLE OF CONTENTS

Peer Reviewed Articles

- Native *Pteropurpura* of the Eastern Pacific (Muricidae) p. 211
By Paul Tuskes and Ann Tuskes
- Checklist of Freshwater Mollusca (Gastropoda and Bivalvia) Recorded from p. 221
the Buriganga and Turag Rivers, Dhaka, Bangladesh
By Mohammad Abdul Baki, Md. Muzammel Hossain and Naser Ahmed Bhouiyan
- Some cone shells with nodules that persist at least into the middle whorls p. 229
(subfamilies Conilithinae and Coninae) from the East Pacific region
By John K. Tucker
- A new subspecies of *Amphidromus* (*Goniodromus*) *bulowi* Fruhstorfer, 1905 p. 235
(Gastropoda: Pulmonata: Camaenidae) from Sumatra, Indonesia
By Jeff Parsons and John Abbas
- A new species of *Vasticardium* (Bivalvia: Cardiidae) from Queensland, Australia p. 248
By Stephen J. Maxwell, Bradley C. Congdon and Tasmin L. Rymer
- *Camaena chuongi*, a new species (Gastropoda: Camaenidae) from Vietnam p. 253
By Nguyen Ngoc Thach
- Six New Species of Gastropods (Fascioliidae, Conidae, and Conilithidae) p. 257
from Brazil
By Edward J. Petuch and David P. Berschauer
- An iconography of the Western Indian endemic abalone *Haliotis unilateralis* p. 267
Lamarck, 1822 (Vetigastropoda: Haliotidae) with notes on its taxonomic history,
distribution, ecology, and evolution
By Buzz Owen and Aaron D. Pan

Club News p. 278

Articles of General Interest

- You Can't Take Them With You p. 279
By David B. Waller
- 2016 COA Convention in Chicago p. 281
By David B. Waller



The quarterly bulletin of the Conchological Society of Southern Africa contains reviews and discussion of Southern African marine and non-marine shells, and information about shell collecting in the region. Membership of the Society is US\$25 per year.

Please contact

The Conchological Society of S.A.
7 Jan Booysen Str.
Annlin 0182 Pretoria
South Africa

or

email mikec@msinfo.mintek.ac.za



Museo Nacional de Ciencias Naturales
José Gutiérrez Abascal, 2
28006 MADRID

SEM (Sociedad Española de Malacología) is a scientific society devoted to the study of molluscs.

Every year the memberships receive the following publications:

- 2 issues of IBERUS
- 1 issue of RESEÑAS MALACOLOGICAS
- 2-3 issues of NOTICIARIO DE LA SEM

some years, 1 extra IBERUS from a Congress or as a supplement.

Membership : 33€ - 40€ - 42€

See:

<http://www.soesma.es/paginas/spanish/socios/Socio.htm>

Please, ask for the inscription print paper.



XENOPHORA

Bulletin de l'Association Française
de Conchyliologie

2010 Yearly subscription
France – Europe – DOM TOM :
Other countries : 60
Visit our site :



BP 307 F-75770 Paris Cedex 16

American CONCHOLOGIST

Calendar membership (Jan - Dec) = \$25 (USA)

Postal surcharges: + \$5 for USA first class,

Canada & Mexico + \$5, other nations + \$15

New members apply to Doris Underwood, Membership Director

698 Sheridan Woods Drive

W. Melbourne, FL 32904-3302

USA

dunderwood1@cfl.rr.com




Quarterly Journal of the Conchologists of America, Inc.

The San Diego Shell Club



The Festivus



Founded in 1961, the San Diego Shell Club is a non-profit organization organized and operated exclusively for educational and scientific purposes and more particularly to enjoy, promote the study of, and further the conservation of Mollusca and associated marine life through lectures, club meetings, and field trips.

The Festivus: A quarterly peer-reviewed publication containing articles on subjects related to malacology and shell collecting, as well as updates on Club events.


Annual Membership Fees: Domestic Electronic Version Worldwide \$20, Domestic Hard Copy Version \$35 and \$55 for Outside the U.S. Visit our Website for a Membership form and payment at www.sandiegoshellclub.com




Contact:
Sylvia van Leeuwen, Secretaris NMV
Van der Helstlaan 19
3723 EV Bilthoven,
the Netherlands.

E-mail: NMV-Secretaris@spirula.nl

Also: spirula.nl



- Spirula, Basteria and Vita Malacologica
- Excursions throughout the Netherlands
- Weekend-excursions
- Monthly meetings and work-groups
- 1000-species days



GLORIA MARIS

A magazine dedicated to the study of shells.

Edited by the Belgian Society for Conchology,
organizers of the Belgium Shellshow

Subscription: Belgium: € 30 - The Netherlands: € 33
Other countries: € 40

Members account manager: J. Wuyts Koningsarendlaan 82 B 2100 Belgium
tel.: 32 3 324 99 14 e-mail: wuyts.jean@scarlet.be



TRITON

Journal of the Israel
Malacological Society

ISSN 1565-1916
Published twice a year since 2000

Keppel Bay Tidings

A quarterly magazine dedicated to the
study of shells.


Edited by the Keppel Bay Shell Club Inc.

Subscription:- \$20.00 Aus.

Apply to:- Keppel Bay Shell Club Inc.

P.O. Box 5166

Central Queensland Mail Centre, 4702
Queensland, Australia.





Grandes marées de l'année 2017

Christiane DELONGUEVILLE et Roland SCAILLET

2017 sera une année moyenne. Le coefficient maximum de 110 sera atteint en avril. On observera un décalage des marées important, ainsi en novembre et en décembre des marées basses importantes auront lieu, ce qui est plutôt exceptionnel pour ces mois de l'année

Coefficients (> 100) des pleines mers à Brest

(Les marées basses correspondantes sont donc particulièrement intéressantes à prospecter.)

Janvier	Vendredi 13	101 - 102
	Samedi 14	102 - 100

Février	Samedi 11	(96) - 100
	Dimanche 12	100 - 100
	Lundi 27	(96) - 100
	Mardi 28	102 - 103

Mars	Mercredi 1	103 - 101
	Mardi 28	101 - 105
	Mercredi 29	108 - 109
	Jeudi 30	109 - 108
	Vendredi 31	104 - 100

Avril	Mercredi 26	102 - 106
	Jeudi 27	109 - 110
	Vendredi 28	110 - 109
	Samedi 29	105 - 101

Mai	Jeudi 25	(99) - 103
	Vendredi 26	105 - 107
	Samedi 27	107 - 106
	Dimanche 28	103 - 100

Juin	Samedi 24	(99) - 102
	Dimanche 25	103 - 103
	Lundi 26	102 - 100

Juillet	Lundi 24	100 - 101
	Mardi 25	102 - 100

Août	Mardi 22	(99) - 101
	Mercredi 23	101 - 101

Septembre	-	-
------------------	---	---

Octobre	Vendredi 6	(99) - 102
	Samedi 7	103 - 104
	Dimanche 8	103 - 101

Novembre	Samedi 4	101 - 104
	Dimanche 5	106 - 107
	Lundi 6	106 - 104
	Mardi 7	101 - (96)

Décembre	Dimanche 3	(96) - 102
	Lundi 4	105 - 107
	Mardi 5	107 - 106
	Mercredi 6	104 - 100

Conseils pour une marée respectueuse de l'environnement : Remettez toujours les pierres en place. Observez, photographiez et n'échantillonnez que le strict nécessaire. Renseignez-vous sur les heures des marées à l'endroit où vous vous trouvez.

REFERENCE :

Annuaire des Marées pour 2017 - Ports de France - Métropole - Tome 1 - SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) - Brest (2015) - 258 p.



Pointe du Conguel - Presqu'île de Quiberon (Morbihan)

Les données reprises dans cet article peuvent également se retrouver sur notre site Internet :

<http://www.societe-belge-de-malacologie.be>